



















逆転写酵素阻害薬

商品名	一般名・略名 (含有量)	用法・用量 (30日分薬価)	食事の 影響	主な副作用と注意事項
コビシビル 	ゾドブジン +ラミブジン COM (300+150mg)	1回1錠 1日2回 12時間毎 (¥111,600)	なし	食欲不振、嘔気、全身倦怠感、貧血、血小板減少、頭痛、筋肉痛、味覚倒錯、乳酸アミノアシ中止によるB型慢性肝炎の悪化 ZDV/3TCの配合剤
エプシコム 	アバガール +ラミブジン EZC (600+300mg)	1回1錠 1日1回 (¥116,115)	なし	発疹、過敏症、乳酸アミノアシ中止によるB型慢性肝炎の悪化 過敏症の発現により本剤の投与を中止した患者に再投与不可 ABC/3TCの配合剤
ツルバタ 	エムトリシビル +フル酸テノホビル ジソプロキシル TVD (200+300mg)	1回1錠 1日1回 (¥112,725)	なし	悪心、下痢、鼓腸、腎機能障害、肺炎、乳酸アミノアシ中止によるB型慢性肝炎の悪化 FTC/TDFの配合剤
レボシビル 	ゾドブジン ZDV (AZT) (100mg)	500-600mg/日 1日量を2-6回 に分けて服用 (¥46,965 ~¥56,358)	なし	食欲不振、嘔気、全身倦怠感、貧血、血小板減少、頭痛、筋肉痛、味覚倒錯、乳酸アミノアシ
エビシビル  	ラミブジン 3TC (150mg, 300mg)	1回150mg 1日2回 若しくは 1回300mg 1日1回 (¥55,638 ~¥57,216)	なし	乳酸アミノアシ 中止によるB型慢性肝炎の悪化
エムトリバ 	エムトリシビル FTC (200mg)	1回1Cap 1日1回 (¥48,594)	なし	乳酸アミノアシ、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化
ザイブゼン 	アバガール ABC (300mg)	1回1錠 1日2回12時毎 若しくは 1回2錠 1日1回24時毎 (¥59,142)	なし	発疹、過敏症、乳酸アミノアシ 過敏症の発現により本剤の投与を中止した患者に再投与不可
ビリアド 	フル酸テノホビル ジソプロキシル TDF (300mg)	1回1錠 1日1回 (¥59,640)	なし	悪心、下痢、鼓腸、腎機能障害、肺炎、乳酸アミノアシ中止によるB型慢性肝炎の悪化


* 海外でHBVに対する効果が認められている

ビラミューン 	ビラブジン NVP (200mg)	1回1錠 1日2回 12時間毎 (¥58,632)	なし	発疹、眠気 発疹には重症例あり注意
ストックリン錠 	エファビレンツ EFV (600mg)	1回1錠 1日1回 (¥55,911)	なし	めまい、ふらつき、発疹、異夢、熱感

プロテアーゼ阻害薬

商品名	一般名・略名 (含有量)	用法・用量 (30日分薬価)	食事の 影響	主な副作用と注意事項
レイタック 	硫酸アタザナビル ATV (200mg, 150mg)	1回2Cap 1日1回 (中等度肝機能障害の場合 300mg/日) (¥33,132 ~¥44,664)	食事中 食直後	悪心、頭痛、発疹、腹痛、下痢、嘔気、黄疸 突発性出血(血友病患者) リボシタロイー
	・ATV(150mg)2Cap+RTV1Cap 1日1回 24時間毎 (¥36,804)			
レクシア 	ホアブプレザビル カシウム水和物 FPV (700mg)	1回2錠 1日2回 12時間毎 (¥92,928)	なし	悪心・嘔吐、下痢、口周囲のしびれ、発疹 突発性出血(血友病患者) リボシタロイー
	・FPV1錠+RTV1Cap 1日2回 12時間毎 ・FPV2錠+RTV2Cap 1日1回 24時間毎 (¥53,808)			
カトラ錠 	ロシナビル+リトナビル LPV・RTV (200mg+50mg)	1回2錠 1日2回 12時間毎 (¥45,252)	なし	下痢、嘔気、異常便、腹痛、無力症、頭痛、不整脈 突発性出血(血友病患者) リボシタロイー
ビラセプト 	ヌル酸ネフィナビル NFV (250mg)	1回5錠 1日2回 12時間毎 (¥47,310)	食後	水様性下痢、発疹 発疹は開始後7~13日に出現 突発性出血(血友病患者) リボシタロイー 空腹時に服用すると吸収が50%低下
ノビアソフトカプセル 	リトナビル RTV (100mg)	1回1~2Cap 1日1~2回 (¥3,672 ~7,344)	食後	悪心・嘔吐、下痢、熱感、全身倦怠感、口周囲のしびれ、突発性出血(血友病患者) リボシタロイー 冷所保存 6Capにビ-ル15ml程度のアルコールを含む
ブリスタ 	ダルザビル DRV (300mg)	・DRV2錠+RTV1Cap 1日2回 12時間毎 (¥58,968)	食後	頭痛、下痢、悪心・嘔吐、腹痛、便秘 突発性出血(血友病患者) リボシタロイー
				

インテグラーゼ阻害薬

アイトリス 	ラルゲナビル RAL (400mg)	1回1錠 1日2回 (¥90,628)	なし	下痢、頭痛、悪心
--	--------------------------	-------------------------------	----	----------

(錠剤、カプセルはほぼ原寸大)