



























逆転写酵素阻害薬


商品名・略名	一般名 (含有量)	用法・用量 (30日分 薬価)	食事の 影響	主な副作用と注意事項
コピビール(COM) 	ジドブジン + ラミブジン (300+150mg)	1回1錠 1日2回 12時間毎 (¥111,600)	なし	食欲不振、嘔気、 全身倦怠感、貧血、血小板 減少、頭痛、筋肉痛、味覚 倒錯、乳酸アミノ酸、中止 によるB型慢性肝炎の悪化 ZDV/3TCの配合剤
エプゾム(EZC) 	アバカビル + ラミブジン (600+300mg)	1回1錠 1日1回 (¥116,115)	なし	発疹、過敏症、 乳酸アミノ酸 中止によるB型慢性肝炎の 悪化 過敏症の発現により本剤の 投与を中止した患者に 再投与不可 ABC/3TCの配合剤
ツルバダ(TVD) 	エムトリシビルン+ フル酸テノホビル ジソプロキシル (200+300mg)	1回1錠 1日1回 (¥112,725)	なし	悪心、下痢、鼓腸、 腎機能障害、肺炎、 乳酸アミノ酸、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の 悪化 FTC/TDFの配合剤
イトビール(ZDV, AZT) 	ジドブジン (100mg)	500 -600mg/日 1日量を 2-6回に分けて 服用 (¥46,965 ~¥56,358)	なし	食欲不振、嘔気、 全身倦怠感、貧血、 血小板減少、頭痛、 筋肉痛、味覚倒錯、 乳酸アミノ酸
エビール(3TC) 	ラミブジン (300mg)	1回300mg 1日1回 (¥55,638 ~¥57,216)	なし	乳酸アミノ酸 中止によるB型慢性肝炎の 悪化
エムトリバ(FTC) 	エムトリシビルン (200mg)	1回1Cap 1日1回 (¥48,594)	なし	乳酸アミノ酸、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の 悪化
ザイブエン(ABC) 	アバカビル (300mg)	1回1錠 1日2回 12時間毎 若しくは 1回2錠 1日1回 24時間毎 (¥59,142)	なし	発疹、過敏症、 乳酸アミノ酸 過敏症の発現により本剤の 投与を中止した患者に 再投与不可
ビリアド(TDF) 	フル酸テノホビル ジソプロキシル (300mg)	1回1錠 1日1回 (¥59,640)	なし	悪心、下痢、鼓腸、 腎機能障害、肺炎、 乳酸アミノ酸 中止によるB型慢性肝炎の 悪化

* 海外でHBVに対する効果が認められている

プロテアーゼ阻害薬

商品名・略名	一般名 (含有量)	用法・用量 (30日分 薬価)	食事の 影響	主な副作用と注意事項
レイタック(ATV) 	硫酸 アガバール (200mg)	1回2Cap 1日1回 (¥33,132)	食事中 食直後	悪心、発疹、下痢、嘔気、 黄疸 突発性出血(血友病患者)
 	・ATV(150mg)2Cap +RTV1錠 1日1回 24時間毎 (¥36,804)			
レクシア(FPV)  	ホスファノレビル 加水和物 (700mg)	1回2錠 1日2回 12時間毎 (¥92,928)	なし	悪心・嘔吐、下痢、 口周囲のしびれ、発疹 突発性出血(血友病患者)
 	・FPV1錠+RTV1錠 1日2回 12時間毎			
  	・FPV2錠+RTV1~2錠 1日1回 24時間毎 (¥50,136~53,808)			
カトル錠(LPV・RTV)  	ロビナビル +リナビル (200mg +50mg)	1回2錠 1日2回 12時間毎 又は1回4錠 1日1回 (¥45,252)	なし	下痢、嘔気、異常便、 腹痛、 無力症、頭痛、不整脈 突発性出血(血友病患者) 跡シストロフィー
プリズタイン錠(DRV)   	ダルビール エタノール付加物 (400mg) DRV(400mg)2錠+RTV1錠 1日1回 24時間毎 (¥58,986)		食後	頭痛、下痢、発疹、悪心・ 嘔吐、便秘 突発性出血(血友病患者) 跡シストロフィー
プリズタ錠(DRV)   	・治療経験がある場合 DRV(300mg)2錠+RTV1錠 1日2回 12時間毎 (¥58,968)			

インテグラーゼ阻害薬

アレクソラ(RAL) 	ラレクガビール (400mg)	1回1錠 1日2回 (¥90,628)	なし	下痢、頭痛、悪心
---	--------------------	---------------------------	----	----------

(錠剤、カプセルはほぼ原寸大)

ヌクレオシド・ヌクレオチド系

非ヌクレオシド系

ストックリン錠(EFV) 	エファビレンツ (600mg)	1回1錠 1日1回 (¥55,911)	なし	めまい、ふらつき、発疹、 異夢、熱感
インテリス錠(ETR)  	エトラビリン (100mg)	1回2錠 1日2回 (¥74,376)	食後	発疹、下痢、悪心 肝機能異常