












核酸系逆転写酵素阻害薬			食事の影響	主な副作用と注意事項
商品名・略名	一般名(含有量)	用法・用量(30日分薬価)		
コンビビル (COM)  ZDV/3TCの配合剤	ズドフゾツ + フミアゾツ (300mg+150mg)	1回1錠 1日2回 (¥96,936)	なし	食欲不振、嘔気、全身倦怠感、貧血、血小板減少、頭痛、筋肉痛、味覚倒錯 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
エブシコム (EZC)  ABC/3TCの配合剤	アハカビル硫酸塩 + フミアゾツ (600mg+300mg)	1回1錠 1日1回 (¥119,433)	なし	発疹、過敏症 過敏症の発現により本剤の投与を中止した患者への再投与不可 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
ツルバダ (TVD)  FTC/TDFの配合剤	エムトシビル + テノホビル フマル酸塩 (200mg+300mg)	1回1錠 1日1回 (¥115,908)	なし	腎機能障害、腹部膨満感、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
デシコピヒト (DVY)  デシコピLT  FTC/TAFの配合剤	エムトシビル + テノホビル フマル酸塩 【HT】 (200mg+28mg) 【LT】 (200mg+11.2mg)	1回1錠 1日1回 HT (¥118,029) (ノビア、エビスタットと併用する場合は【LT】) LT (¥82,446)	なし	腹部膨満感、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
ピリアード (TDF)  FTC/3TCの配合剤	テノホビル フマル酸塩 (300mg)	1回1錠 1日1回 (¥61,344)	なし	腎機能障害、腹部膨満感 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
エムトリバ (FTC)  FTCの配合剤	エムトシビル (200mg)	1回1Cap 1日1回 (¥49,929)	なし	皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
ザリアジェン (ABC)  ABCの配合剤	アハカビル硫酸塩 (300mg)	1回1錠1日2回 もしくは 1回2錠1日1回 (¥51,780)	なし	発疹、過敏症 過敏症の発現により本剤の投与を中止した患者への再投与不可
エピビル (3TC)  3TCの配合剤	フミアゾツ (300mg)	1回1錠 1日1回 (¥49,473)	なし	中止によるB型慢性肝炎の悪化*


非核酸系逆転写酵素阻害薬			*海外でHBVに対する効果が認められている	
商品名・略名	一般名(含有量)	用法・用量(30日分薬価)	食事の影響	主な副作用と注意事項
エジュラント (RPV)  RPVの配合剤	リルビビル硫酸塩 (25mg)	1回1錠 1日1回 (¥63,261)	食後	頭痛、嘔気、不眠症、浮動性めまい

非核酸系逆転写酵素阻害薬+核酸系逆転写酵素阻害薬*				
コンプレラ (CMP)  RPV/FTC/TDFの配合剤	リルビビル + エムトシビル + テノホビル フマル酸塩 (25mg+200mg+300mg)	1回1錠 1日1回 (¥174,534)	食後	腎機能障害、腹部膨満感、皮膚変色、頭痛、嘔気、不眠症、浮動性めまい 中止によるB型慢性肝炎の悪化*

プロテアーゼ阻害薬				
商品名・略名	一般名(含有量)	用法・用量(30日分薬価)	食事の影響	主な副作用と注意事項
カレトラ (LPV/rvt)  LPV/rvtの配合剤	ルビナビル + リタナビル (200mg+50mg)	1回2錠1日2回 または 1回4錠1日1回 (¥39,684)	なし	下痢、嘔気、腹痛、無力症、頭痛、不整脈、リボシトロフィー
プリジスタナイーブ (DRV)  DRV/COBIの配合剤	ダルバビル + イタナール付加物 (800mg)	1回各1錠 1日1回 (¥60,084)	食後	頭痛、下痢、発疹、嘔気、リボシトロフィー
プレジコピックス (PCX)  DRV/COBIの配合剤	ダルバビル + イタナール付加物 + エビスタット (800mg+150mg)	1回1錠 1日1回 (¥60,084)	食後	頭痛、下痢、発疹、嘔気、リボシトロフィー

インテグラーゼ阻害薬				
アイセントレス (RAL)  RALの配合剤	ラルゲナール (400mg)	1回1錠 1日2回 (¥93,216)	なし	頭痛、掻痒感
テビケイ (DTG)  DTGの配合剤	ドルゲナール (50mg)	1回1錠1日1回 (¥97,878) (インテグラーゼ阻害薬に対する耐性を有する場合は1回1錠1日2回)	なし	悪心、下痢、頭痛、不眠

インテグラーゼ阻害薬+核酸系逆転写酵素阻害薬*				
ゲンボイヤ (GEN)  EVG/COBI/FTC/TAFの配合剤	エムトシビル + エビスタット + エムトシビル フマル酸塩 (150mg+150mg+200mg+11.2mg)	1回1錠 1日1回 (¥208,263)	食後	腹部膨満感、皮膚変色、悪心、下痢、異夢、頭痛 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
トリメク (TRI)  DTG/ABC/3TCの配合剤	ドルゲナール + アハカビル硫酸塩 + フミアゾツ (50mg+600mg+300mg)	1回1錠 1日1回 (¥210,009)	なし	発疹、過敏症、悪心、下痢、頭痛、不眠 過敏症の発現により本剤の投与を中止した患者への再投与不可 中止によるB型慢性肝炎の悪化*

CCR5阻害薬				
シーエルセントリ (MVC)  MVCの配合剤	マラビロク (150mg)	1回2錠1日2回 (¥281,268) 強力なCYP3A4阻害剤を併用する場合 1回1錠1日2回 強力なCYP3A4誘導剤を併用する場合 1回4錠1日2回	なし	疲労、発疹、浮動性めまい