





















逆転写酵素阻害薬

商品名	一般名・略名 (含有量)	用法・用量 (30日分薬価)	食事の 影響	主な副作用と注意事項
コビシビル 	ジドブジン +ラミブジン COM (300+150mg)	1回1錠 1日2回 12時間毎 (¥113,574)	なし	食欲不振、嘔気、全身倦怠感、貧血、血小板減少、頭痛、筋肉痛、味覚倒錯、乳酸アシドーシス 中止によるB型慢性肝炎の悪化 ZDV/3TCの配合剤
エプソコム 	エパルビル +ラミブジン EZC (600+300mg)	1回1錠 1日1回 (¥117,498)	なし	発疹、過敏症、乳酸アシドーシス 過敏症の発現により本剤の投与を中止した患者に再投与不可 ABC/3TCの配合剤
ツルバタ 	エムトシビル +フルボレン ジソプロキシル TVD (200+300mg)	1回1錠 1日1回 (¥115,032)	なし	悪心、下痢、鼓腸、腎機能障害、肺炎、乳酸アシドーシス 皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化 FTC/TDFの配合剤
レトビル 	ジドブジン ZDV (AZT) (100mg)	500-600mg/日 1日量を2-6回 に分けて服用 (¥47,805 ~¥57,366)	なし	食欲不振、嘔気、全身倦怠感、貧血、血小板減少、頭痛、筋肉痛、味覚倒錯、乳酸アシドーシス
ゼリット 	サリルブジン d4T (20mg, 15mg)	1回2Cap 1日2回 12時間毎 (体重60Kg 未満の場合 60mg/日) (¥59,004 ~¥59,364)	なし	末梢神経障害、乳酸アシドーシス、肺炎、筋肉のやせ、頬がこける
エビシビル 	ラミブジン 3TC (150mg, 300mg)	1回150mg 1日2回 若しくは 1回300mg 1日1回 (¥56,067 ~¥58,104)	なし	乳酸アシドーシス 中止によるB型慢性肝炎の悪化
エムトリバ 	エムトシビル FTC (200mg)	1回1Cap 1日1回 (¥48,594)	なし	乳酸アシドーシス、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化
グアテックスEC 1/3 Sample 	ジダラジン ddI (200mg, 125mg)	1回2Cap 1日1回 (¥71,394 ~¥112,434)	食間	末梢神経障害、乳酸アシドーシス、肺炎、筋肉のやせ、頬がこける 空腹時服用 腸溶性顆粒を加割りに充填
ルビナット 1/2 Sample 	ザルシビル ddC (0.375mg)	1回2錠1日3回 (¥125,352)	なし	末梢神経障害、乳酸アシドーシス、肺炎、筋肉のやせ、頬がこける
ザイアジエン 	エパルビル ABC (300mg)	1回1錠 1日2回12時毎 若しくは 1回2錠 1日1回24時毎 (¥59,976)	なし	発疹、過敏症、乳酸アシドーシス 中止によるB型慢性肝炎の悪化 過敏症の発現により本剤の投与を中止した患者に再投与不可
ビリアード 	フルボレン ジソプロキシル TDF (300mg)	1回1錠 1日1回 (¥61,467)	なし	悪心、下痢、鼓腸、腎機能障害、肺炎、乳酸アシドーシス 中止によるB型慢性肝炎の悪化

ヌクレオシド・ヌクレオチド系

非ヌクレオシド系	ビマムン 	ビマムン NVP (200mg)	1回1錠 1日2回 12時間毎 (¥60,126)	なし	発疹、眠気 発疹には重症例あり注意
	ストックリン 	エファビレンツ EFV (200mg)	1回3Cap 1日1回 (¥59,886)	なし	めまい、ふらつき、発疹、異夢、熱感

プロテアーゼ阻害剤

商品名	一般名・略名 (含有量)	用法・用量 (30日分薬価)	食事の 影響	主な副作用と注意事項
レイタツツ 	硫酸アタザビル ATV (200mg, 150mg)	1回2Cap 1日1回 (中等度肝機能障害の場合 300mg/日) (¥34,122 ~¥45,708)	食事中 食直後	悪心、頭痛、発疹、腹痛、下痢、嘔気、黄疸 突発性出血(血友病患者) 腸ジストロフィー
	・ATV(150mg)2Cap+RTV1Cap 1日1回 24時間毎 (¥37,878)			
レクシア 	ホスアプタラビル カルシウム水和物 FPV (700mg)	1回2錠 1日2回 12時間毎 (¥94,404)	なし	悪心・嘔吐、下痢、口周囲のしびれ、発疹 突発性出血(血友病患者) 腸ジストロフィー
	・FPV1錠+RTV1Cap 1日2回 12時間毎 ・FPV2錠+RTV2Cap 1日1回 24時間毎 (¥54,714)			
カトラ錠 	ロピナビル LPV+RTV (200mg+50mg)	1回2錠 1日2回 12時間毎 (¥46,332)	なし	下痢、嘔気、異常便、腹痛、無力症、頭痛、不整脈 突発性出血(血友病患者) 腸ジストロフィー
ビラゲート 	メシル酸ネフィビル NFV (250mg)	1回5錠 1日2回 12時間毎 (¥48,570)	食後	水様性下痢、発疹 発疹は開始後7~13日に出現 突発性出血(血友病患者) 腸ジストロフィー 空腹時に服用すると吸収が50%低下
ノビアソトカブ 	リトナビル RTV (100mg)	1回1~2Cap 1日1~2回 (¥3,756 ~7,512)	食後	悪心・嘔吐、下痢、熱感、全身倦怠感、口周囲のしびれ、突発性出血(血友病患者) 腸ジストロフィー 冷所保存 6Capにビール15ml程度のアルコールを含む
クニキバン 1/5 Sample 	硫酸インジナビル IDV (200mg)	1回4Cap 1日3回 8時間毎 (¥42,516)	食間	腎結石、嘔気・嘔吐、全身倦怠感、腸ジストロフィー 空腹時服用(少量低脂肪食可) 1日1.5リットル以上の水と共に服用
イビラセ 1/5 Sample 	メシル酸サビビル SQV-HGC (200mg)	1回3Cap 1日3回 (¥45,603)	食後	突発性出血(血友病患者) 腸ジストロフィー

* 海外でHBVに対する効果が認められている